

ISOPERIDOL®

Halopéridol 2mg/ml, Solution en gouttes buvables, 20ml et 50ml.

FORME, PRÉSENTATION ET MODE D'ADMINISTRATION :

Ce médicament est en gouttes buvables à 2 mg/ml d'halopéridol. 1 ml = 20 gouttes.

Les gouttes peuvent être absorbées après dilution dans l'eau. Il se peut que l'action complète du médicament n'apparaisse pas immédiatement. Vous ne devez pas modifier les doses et l'horaire des prises ni interrompre votre traitement, sans l'accord de votre médecin.

COMPOSITION :

Halopéridol.....0.2g

Phb de méthyl.....0.09g

Excipients aromatisés, (arôme cerise), Q.S.P.....100 ml

INDICATIONS : Ce médicament est préconisé dans certains troubles du caractère ou du comportement ainsi que lors des vomissements survenant après une radiothérapie.

CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

Allergies connues à l'halopéridol (éruption cutanée, démangeaisons, difficultés à respirer ou gonflement de la face).

Maladie de Parkinson.

Association à la levodopa.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Epilepsie, troubles hépatiques ou rénaux, affections cardiovasculaires graves.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS: Halopéridol peut modifier l'action de certains médicaments:

Les anti-parkinsoniens (lévodopa)

Les sédatifs et les antalgiques.

Les anti-dépresseurs (lithium).

Les anti-hypertenseurs (guanéthidine).

Alcool : abstenez-vous de boissons alcoolisées pendant la durée du traitement car Halopéridol augmente les effets de l'alcool.

GROSSESSE : En cas de grossesse ou de désir de grossesse, informez votre médecin qui décidera si vous pouvez prendre Halopéridol.

ALLAITEMENT : Il existe un passage d'halopéridol dans le lait maternel, par conséquent l'allaitement est déconseillé pendant la durée du traitement.

MISE EN GARDE: CONDUCTEURS ET UTILISATEURS DE MACHINES :

L'attention est attirée notamment chez les conducteurs et les utilisateurs de machines, sur les risques de somnolence attachés à l'emploi de ce médicament. Il est donc recommandé de ne pas utiliser de machines et de ne pas conduire avant que votre médecin n'ait évalué votre réaction à l'Hopéridol.

POSOLOGIE : Doit être adaptée à chaque cas.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas d'ingestion accidentelle d'une quantité trop importante d'Halopéridol, consultez immédiatement votre médecin.

EFFETS INDÉSIRABLES: COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS:

Hypotension orthostatique.

Somnolence en particulier au début du traitement, en cas de traitement prolongé; mouvements involontaires de la langue, du visage, de la bouche ou de la mâchoire, mouvements involontaires et incoordonnés des membres.

Tremblement ou rigidité musculaire.

Chez la femme : aménorrhée, galactorrhée.

Chez l'homme : une augmentation du volume des seins peut également apparaître.

Hyperglycémie.

Impuissance, frigidité.

Plus rarement: Allergies cutanées, nervosité, prise de poids, possibilité de modification du bilan sanguin (Agranulocytose et de thrombocytopénie)

En cas de fièvre inexpliquée, des signes d'infection, de saignement du nez ou de la gencive, contactez rapidement votre médecin.

CONDITIONS DE DELIVRANCE: uniquement sur ordonnance médicale.

CONSERVATION:

Entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N° d'enregistrement: 09/99/16 D 085/073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P. : Z.I TARG Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com



إزويريدول

هالوبيريدول 2مغ/مل قطرات للشرب 20 مل و 50مل

الوصف وطريقة الاستعمال:

محلول قطرات للشرب، قارورة 20 مل. 1 مل يحتوي على 20 قطرة. يمكن استعمال هذا الدواء مع قليل من الماء. قد لا تظهر فعالية هذا الدواء سريعا، لذلك لا يجب تغيير الجرعات أو أوقات تناولها ولا حتى إيقاف الدواء إلا برأي الطبيب.

التكوين:

هالوبيريدول 0.2غ
براهيدروكسي بنزوات مثيل 0.09غ
سواغ معطر، (عطر الكرز)، ك.ك.ل. 100مل

دواعي الاستطباب:

هذا الدواء يستعمل في بعض حالات هيجان المزاج والتصرف، ويستعمل كذلك في حالات القىء الناتجة عن المعالجة بالأشعة.

مضادات الاستطباب:

• حساسية للهالوبيريدول (حساسية جلدية، صعوبات في التنفس أو انتفاخ في الوجه).
• مرض باركنسون
• في حالة استعمال la Levodopa

احتياطات الاستعمال:

• حالة الصرع
• حالات اضطرابات الكبد أو الكلى
• حالات إصابات الشرايين والقلب الخطيرة

تفاعلات مع الأدوية:

الهالوبيريدول يمكن أن يغيرمفعول بعض الأدوية :

المضادة لمرض Parkinson

الممنومة أو المضادة للألام

المضادة للانهيار العصبي

المضادة لارتفاع ضغط الدم

• الكحول: الامتناع عن أخذ المشروبات الكحولية أثناء فترة العلاج
بالهالوبيريدول.

الحمل والرضاعة:

إذا كانت المرأة حاملا أوكانت تريد الحمل يجب أخذ رأي الطبيب. لاينصح بالإرضاع خلال فترة العلاج.

تنبيه: السائق ومستعملي الماكينات

الحذر مطلوب عند سائقي السيارات أو مستعملي الماكينات نظرا لحالة النعاس التي يسببها هذا الدواء.

الجرعة وطريقة الاستعمال:

الجرعة مختلفة من حالة لأخرى.

كيفية التعامل مع فرط الجرعة:

في حالة تناول جرعة مفرطة من هالوبيريدول، راجع الطبيب فوراً.

الآثار الأخرى الممكنة للدواء:

كل كل مستحضر نشط هذا الدواء يستطيع عند بعض الأشخاص أن يسبب أعراضا مزعجة مثل:

•انخفاض ضغط الدم(الإحساس بالدوران عند المرور المفاجئ من وضعية الجلوس أو النوم إلى وضعية الوقوف).

•النعاس، خاصة عند بداية العلاج.

•في حالة إطالة العلاج حدوث حركات لا إرادية للسان، الوجه، الفم أو الفك، أو حركات لا إرادية وغير منسجمة للأطراف، أطلبوا نصائح طبييكم.

•في حالة ارتعاش أو ارتخاء العضلات اتصلوا بطبييكم الذي سيغير الجرعات أو يعدل العلاج

•عند المرأة: يمكن أن يسبب هذا الدواء اضطرابا في العادة الشهرية أو سيلان الحليب في غير الأوقات العادية للرضاعة، كما يمكن أن يسبب عند الرجل زيادة في حجم الأثناء.

•ارتفاع نسبة السكر في الدم

•العجز الجنسي أوالبرودة الجنسية

وفي حالات نادرة يسبب الدواء:

•الحساسية الجلدية- انفعالات عصبية أو زيادة الوزن

•إمكانية حدوث تغيير في موازنة الدم معتدلة وعادة عابرة

•نادرا يحدث اختفاء شبه كلي للكريات البيضاء أو انخفاض معدل بعض مكونات الدم، في حالة حدوث حمى مفاجئة، أعراض انتفاخ أو جريان الدم من الأنف أو اللثة أوحدوث أي أعراض غير مذكورة اتصلوا حالا بطبييكم.

شروط التوزيع: لا يعطى هذا الدواء إلا بوصفة طبية.

الحفظ: بين 15° و 30°م في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 085/073 09/99/16D

لا تترك الدواء في متناول الأطفال.

مخابر إيزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب.75 الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

