

ZITRINE®

Dichlorhydrate de cétirizine 10mg/ml solution buvable en gouttes

FORMES ET PRÉSENTATIONS:

Solution buvable en gouttes à 10 mg/ml , flacon de 15 ml ou 300 gouttes.

COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE:

Dichlorhydrate de cétirizine 1,000 g

Excipients : Glycérol, propylène glycol, saccharine sodique, acétate de sodium, acide acétique glacial, eau purifiée pour 100 ml.

Excipients à effet notoire : parahydroxybenzoate de méthyle, parahydroxybenzoate de propyle.

DANS QUEL (S) CAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

ZITRINE est un antihistaminique

Il est préconisé chez l'adulte et l'enfant à partir de 2 ans :

- Traitement des symptômes nasaux et oculaires des rhinites allergiques saisonnières et perannuelles.
- Traitement des symptômes de l'urticaire chronique idiopathique.

ATTENTION !

DANS QUEL (S) CAS NE PAS UTILISER CE MÉDICAMENT:

Ce médicament NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ dans les cas suivants:

- Allergie à l'un des constituants,
- Insuffisance rénale,

FAITES ATTENTION AVEC LA CETIRIZINE:

La cétirizine doit être administrée avec prudence chez les patients épileptiques ou à risque de convulsions.

L'utilisation de ce médicament n'est pas recommandée chez l'enfant de moins de 2 ans.

INTERACTIONS AVEC D'AUTRES MÉDICAMENTS ET AUTRES FORMES D'INTERACTIONS

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments ; il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

La prudence est recommandée lors de la prescription chez la femme enceinte ou en cas d'allaitement, en raison du passage

de la cétirizine dans le lait maternel.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT:

-Adultes et adolescents de plus de 12 ans:

10 mg une fois par jour, soit 20 gouttes une fois par jour.

-Enfants de 6 à 12 ans:

5 mg deux fois par jour, soit 10 gouttes deux fois par jour.

-Enfants de 2 à 6 ans:

2,5 mg deux fois par jour, soit 5 gouttes deux fois par jour.

Les gouttes doivent être diluées dans une petite quantité d'eau ou de jus, puis avalées immédiatement.

DUREE DE TRAITEMENT:

Se conformer à l'ordonnance de votre médecin.

CONDUITE A TENIR EN CAS DE SURDOSAGE:

Consulter votre médecin.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS:

- Possibilité de troubles digestifs, bouche sèche, vertige
- Exceptionnellement, ont été décrits des cas de réactions allergiques à type de réactions cutanées et œdème de Quincke
- Chez l'enfant, possibilité de somnolence

CONSERVATION:

Entre 15° C et 25° C dans son emballage d'origine.

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement extérieur

CONDITION DE DELIVRANCE:

Uniquement sur ordonnance, Liste II
NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

DATE DE REVISION DE LA NOTICE : Septembre 2014

N° d'enregistrement : 19/01A041/073

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P. : Z.I.TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.01.74/79 Fax : 031.95.01.75/77/78
<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



زيترين[®]

ديكلورهيديرات سيتيريزين 10 مغ/مل محلول للشرب على شكل قطرات

الشكل و التقديم:

محلول للشرب على شكل قطرات 10 مغ/مل، قارورة 15 مل أو 300 قطرة

التكوين:

ديكلورهيديرات سيتيريزين 1.00 غ
السواغات : غليسول، بروبيلان، غليكول، صوديوم السكرين، اسيتات الصوديوم، حمض اسيتيك متجمد، ماء مقطر كمية كافية ل 100 مل
السواغات ذات تأثير معلوم : براهيدروكسي بنزوات الميثيل و براهيدروكسي بنزوات البروبيل

دواعي الاستعمال:

زيترين هو مضاد للهستامين
ينصح بهذا الدواء للكبار و الأطفال ابتداءا من السنة الثانية لمعالجة الأعراض التالية :

- التهاب الأنف و العينين الناتج عن الحساسية
- الحكة المزمنة مجهولة السبب

تنبيه !

موانع الاستعمال:

لا يجب استخدام هذا الدواء في الحالات التالية :
-سوابق تحسسية لأحد مكونات الدواء
-القصور الكلوي

تحذيرات:

يجب توخي الحذر عند استعمال هذا الدواء للمرضى المصابين بداء الصرع أو الذين لديهم احتمال الإصابة بالتنشج يستحسن عدم استعمال هذا الدواء للأطفال الذين يقل سنهم عن سنتين

التفاعلات الدوائية:

لتفادي التفاعلات الدوائية المحتملة بين عدة أدوية يجب إبلاغ الطبيب أو الصيدلي عن كل علاج آخر قيد الاستعمال

الحمل و الإرضاع:

يجب توخي الحذر عند وصف هذا الدواء للمرأة الحامل أو المرضعة، بسبب مرور سيتيريزين إلى حليب الأم.

في حالات الشك ينبغي استشارة طبيبك أو الصيدلي

كيفية استخدام هذا الدواء:

-عند الكبار و الأطفال فوق 12 سنة :
10 مغ مرة في اليوم أي 20 قطرة مرة في اليوم
-عند الأطفال من 6 إلى 12 سنة :
5 مغ مرتين في اليوم أي 10 قطرات مرتين في اليوم
-عند الأطفال من 2 إلى 6 سنوات :
2.5 مغ مرتين في اليوم أي 5 قطرات مرتين في اليوم
القطرات تصب في كمية من الماء أو العصير ثم تشرب فوراً

مدة العلاج:

يجب الامتنال لوصفة الطبيب

طريقة التعامل مع فرط الجرعة:

يجب إبلاغ الطبيب

التأثيرات غير المرغوب فيها و المضرة:

-اضطرابات المعدة، جفاف الفم، شعور بدوار
-إستثنايا سجلت حالات من نوع الحساسية الجلدية و انتفاخ كينك
-عند الأطفال إمكانية النوم الخفيف

الحفظ:

يحفظ في درجة حرارة عادية ما بين 15 و 25 درجة
لا تتجاوز التاريخ الأقصى للاستعمال المذكور على التوضيب الخارجي

شروط التوزيع:

لا يصرّف إلا بوصفة طبية، القائمة II
لا يترك في متناول الأطفال

تاريخ مراجعة النشرة : سبتمبر 2014

رقم التسجيل: 19/01A041/073

مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.01.74/79 - الفاكس: 031.95.01.75/77/78

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com

