

MUCOREX®

Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT, flacon de 150ml

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
 - Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
 - Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
 - Vous devez vous adresser à votre médecin si vous vous sentez moins bien ou si vous ne ressentez aucune amélioration au bout de 8 jours.
- Ne laissez pas ce médicament à la portée des enfants.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?
3. Comment prendre MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : Mucolytiques.

Traitement des troubles de la sécrétion bronchique de l'adulte, notamment au cours des affections bronchiques aiguës et des épisodes aigus des bronchopneumopathies chroniques.

Ce médicament est un expectorant. Il facilite l'évacuation par la toux des sécrétions bronchiques.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?

Ne prenez jamais MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au chlorhydrate d'ambroxol ou à l'un des autres

composants.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre MUCOREX.

Des cas de réactions cutanées graves ont été signalés lors de l'administration d'ambroxol. Si une éruption apparaît sur votre peau (y compris des lésions des muqueuses, par exemple au niveau de la bouche, de la gorge, du nez, des yeux, des organes génitaux), arrêtez d'utiliser MUCOREX et contactez immédiatement votre médecin.

Ce médicament contient du sorbitol. Son utilisation est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au sorbitol (maladie héréditaire rare).

Il est conseillé de ne pas prendre de médicament antitussif ou de médicament asséchant les sécrétions bronchiques durant la période de traitement par ce médicament.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants

Ce médicament ne doit pas être utilisé chez l'enfant de moins de 12 ans.

Autres médicaments et MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Il est préférable de ne pas utiliser ce médicament pendant la grossesse et au cours de l'allaitement.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT contient du sorbitol, du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle.

3. COMMENT UTILISER MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie

La posologie de ce médicament est de 1 cuillère à soupe matin et soir.

Mode d'administration

Voie orale.

Fréquence d'administration

Les prises seront espacées à intervalles réguliers.

Durée du traitement

La durée du traitement ne dépassera pas 8 à 10 jours sans avis médical.

Utilisation chez les enfants et les adolescents
RESERVE A L'ADULTE.

Si vous avez pris plus de MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Rare : pouvant survenir au maximum chez 1 personne sur 1 000 :

- Réactions d'hypersensibilité
- Éruption cutanée, urticaire

Fréquence indéterminée : ne peut être estimée sur la base des données disponibles :

- Réactions anaphylactiques, dont choc anaphylactique, angio-oedème (gonflement rapide de la peau, du tissu sous-cutané, de la muqueuse ou du tissu sous-muqueux) et prurit
- Réactions cutanées sévères (dont érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson/syndrome de Lyell et pustulose exanthématique aiguë généralisée)

Ont été également décrits :

- Possibilité de survenue de troubles digestifs mineurs à type de nausées, vomissements, brûlures d'estomac.
- Il est conseillé dans ces cas de diminuer la posologie.
- Rarement ont été rapportés des maux de tête ou des vertiges.

5. COMMENT CONSERVER MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon après EXP. Pas de précautions particulières de conservation.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient MUCOREX ; Chlorhydrate d'ambroxol, solution buvable 0,3 POUR CENT
Chlorhydrate d'ambroxol..... 300 mg
Pour 100 mL de solution buvable.

Excipients à effet notoire : sorbitol, du parahydroxybenzoate de méthyle et de propyle.

Condition de délivrance :

Médicament non soumis à prescription médicale.

NE JAMAIS LAISSER A LA PORTEE DES ENFANTS.

Date de révision de la notice : 10/11/2016

Numéro d'enregistrement :07/20 D 064/073

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100
Constantine. Tel: 03 1.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07
<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



ميكوراكس[®]

كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 غ/100 مل محلول للشرب 150 مل - بدون سكر

يرجى قراءة النشرة بعناية قبل اخذ هذا الدواء لأنه يحتوي على معلومات هامة بالنسبة لك.

يأخذ هذا الدواء تماما كما في المعلومات الواردة في هذه النشرة وأومن الطبيب أو الصيدلي.

• حافظ على هذه النشرة قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.

• تحدث إلى الصيدلي لأي نصيحة أو معلومة.

• إذا شعرت بأي آثار جانبية، استشر الطبيب أو الصيدلي أو الممرضة وهذا ينطبق أيضا على أي آثار جانبية محتملة غير موجودة في هذه النشرة. انظر القسم 4.

• يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا كنت تشعر سوء أو إذا كنت لا تشعر بأي تحسن بعد 8 أيام.

• لا يتك هذا الدواء في تناول الأطفال.

على ماذا تحتوي هذه النشرة؟

1 ما هو ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب وفي أي حالة يتم استخدامه؟

2 ما هم المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب ؟

3 كيف يأخذ ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب ؟

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

5 كيف يحفظ ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب ؟

6 محتوى التعبئة والتغليف وغيرها من المعلومات.

1 ما هو ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب وفي أي حالة يتم استخدامه؟

تصنيف الدواء : الادوية الحالة للميوسين

علاج اضطرابات إفراز القصبية الرئوية لدى البالغين، خصوصا اضطرابات الشعب الهوائية والنوبات الحادة من المرض الانسداد الرئوي المزمن.

هذا الدواء هو مقشع. فهو يسهل إزالة إفرازات القصبية الرئوية عن طريق السعال.

2. ما هم المعلومات التي يجب معرفتها قبل أخذ ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب ؟

لا تأخذ ميكوراكس 0.3 % محلول للشرب، إذا كان لديك حساسية لأمبروكسول هيدروكلوريد أو غيرها من مكونات الدواء.

إذا كان لديك شك، فمن الضروري أن تسأل الطبيب أو الصيدلي.

التحذيرات والاحتياطات:

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل اخذ ميكوراكس.

تم الإبلاغ عن حالات تفاعلات جلدية شديدة خلال اخذ امبروكسول. إذا ظهر طفح على الجلد (هما في ذلك الغشاء المخاطي للحم والحنك والأنف والعينين والأعضاء التناسلية)، يجب التوقف عن استخدام ميكوراكس والاتصال بالطبيب على الفور.

هذا الدواء يحتوي على السوربيتول. لا ينصح استخدامه عند المرضى الذين يعانون من عدم تحمل السوربيتول (مرض وراثي نادر).

ومن المستحسن عدم تناول أدوية السعال أو أدوية تجفيف الإفرازات القصبية خلال فترة العلاج بهذا الدواء.

في حالة الشك لا تتردد في مخاطبة الطبيب أو الصيدلي.

الأطفال:

لا ينبغي أن تستخدم هذا الدواء عند الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 12 سنة.

الأدوية الأخرى وميكوراكس، كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب :

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تأخذ أو أخذت أو ستأخذ أي أدوية أخرى.

الحمل والرضاعة والخصوبة

إذا كنت حاملا أو مرضعة، إذا كنت تعتقدين أنك حاملا أو تخططين للحمل، إسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء، فمن الأفضل عدم استخدام هذا الدواء أثناء الحمل وأثناء الرضاعة.

إذا اكتشفت أنك حامل أثناء فترة العلاج، يجب استشارة طبيبك بسرعة لأنه هو الوحيد الذي يمكن أن يحكم على ضرورة مواصلة العلاج.

يحتوي ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب على سوربيتول، البراهيدروكسي بنزوات الميثيل والبروبييل.

3. كيفية استعمال ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب ؟

يرجى أخذ الدواء حسب تعليمات طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي في حالة الشك.

الجرعة:

جرعة من هذا الدواء هي 1 ملعقة كبيرة الصباح والمساء.

طريقة الاستعمال:

عن طريق الفم.

كيفية توزيع الجرعة:

تقسم الجرعة الدوائية اليومية في فترات منتظمة.

مدة العلاج:

لا تزيد مدة العلاج على 8 إلى 10 أيام دون استشارة طبية.

الإستعمال للأطفال والمراهقين

تنبيه للبالغين :

إذا تجاوزت الجرعة اليومية المذكورة لميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب عليك استشارة طبيبك أو الصيدلي على الفور.

4. ما هي الآثار الجانبية المحتملة؟

مثل جميع الأدوية، يمكن لهذا الدواء أن يسبب آثارا جانبية، ولكن لا تحصل لكل الأشخاص.

نادرا: قد تحدث كحد أقصى لشخص في 1000 شخص:

• تفاعلات فرط التحسس

• طفح.

غير معروف: لا يمكن تقديرها من المعطيات الموجودة:

الحساسية، بما في ذلك صدمة الحساسية، دمة وعائية (انتفاخ سريع في

الجلد والأنسجة تحت الجلد، الأغشية المخاطية أو الأنسجة تحت المخاطية) والحكة

• ردود فعل الجلد الحادة (بما في ذلك حمامي متعدد الأشكال، متلازمة ستيفن

جونسون، انحلال البشرة النخري السمي وبثارالطفح الحاد المعمم)

و أيضا:

• إمكانية ظهور اضطرابات هضمية طفيفة مثل الغثيان والقيء وحرقة، ينصح

تقليل الجرعة في هذه الحالات.

• يحدث نادرا: صداع أو دوخة.

5. كيفية حفظ ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب؟

يحفظ هذا الدواء بعيدا عن عين ومنتناول الأطفال.

لا تستعمل هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.

لا توجد ظروف حفظ خاصة.

6. محتوى العبوة وغيرها من المعلومات

يحتوي ميكوراكس كلورهيدرات الأمبروكسول 0.3 % محلول للشرب على:

امبروكسول هيدروكلوريد 300 مغ في

100 مل من محلول الشرب.

سواغ ذات تأثير معروف: السوربيتول، براهيدروكسي بنزوات الميثيل والبروبييل.

شروط تسليم الدواء: لا يحتاج هذا الدواء لوصفة طبية.

لايتك في تناول الأطفال.

تاريخ مراجعة الإرشادات: 2016/11/10

رقم التسجيل: 07/20D064/073



مخابر ايزوفارم - الجزائر: م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب - قسنطينة 25100

الهاتف: 031.95.44.03/06/07 الفاكس: 031.95.44.04/05

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com