

# ISOPTYL®

*Amitriptyline chlorhydrate 40mg/ml solution pour gouttes buvables 20 ml*

## **FORME ET PRÉSENTATION:**

Solution pour gouttes buvables.

Flacon de 20 ml

1 ml de solution buvable = 20 gouttes = 40 mg de principe actif.

Chaque goutte de solution buvable contient 2mg de principe actif.

## **COMPOSITION:**

Amitriptyline chlorhydrate (DCI) ..... 4.528 gr

**Excipients:** Phb méthyle et propyle, Ethanol, Arôme de Cerise, Eau.....Q.S.P .....100 ml

## **PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES:**

Ce médicament demande plusieurs jours avant d'agir.

## **INDICATIONS:**

- Episodes dépressifs majeurs.

- Algies rebelles.

Ce médicament peut être prescrit dans certains cas d'énurésie à partir de 4 ans lorsque toutes les causes organiques ont été exclues.

## **CONTRE-INDICATIONS:**

Traitement avec un antidépresseur, IMAO. Glaucome à angle fermé

Troubles prostatiques avec difficultés à uriner.

En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

## **PRÉCAUTIONS D'EMPLOI:**

Il est important de prévenir votre médecin :

Si vous avez eu des affections cardiovasculaires, ou prostatiques.

Si vous avez fait des convulsions, ou si vous souffrez d'hypertension artérielle.

Si vous êtes enceinte, ou si vous désirez l'être.

Notez aussi que l'absorption d'alcool, ainsi que l'allaitement sont déconseillés pendant le traitement.

Afin d'éviter d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ne jamais laisser à la portée des enfants.

## **EFFETS INDÉSIRABLES ET MISES EN GARDE:**

Sécheresse de la bouche, hypotension artérielle lors de brusques changements de position, constipation ou difficultés à uriner, somnolence ou excitation, troubles visuels pouvant parfois rendre dangereuse la conduite de véhicules ou de machines.

## **MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE:**

Voie orale.

La posologie a été adaptée à votre cas par votre médecin. Conformez vous strictement à son ordonnance, n'augmentez jamais votre traitement sans son avis.

Les caractéristiques pharmacocinétiques de ce médicament autorisent une seule prise journalière, pendant les repas ou à distance de ceux-ci.

## **CONDITIONS DE DELIVRANCE:**

Uniquement sur ordonnance médicale.

## **CONSERVATION:**

Entre 15 c° et 30 c° dans son emballage d'origine.

*Date de révision* : 01/2017

*N° d'enregistrement*: 16 / 98 / 16A003 / 073

**Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.**

### **LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE**

U.P : ZI TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : [isopharm@gmail.com](mailto:isopharm@gmail.com)



# إيزوبتيل<sup>®</sup>

أميتيبيتيلين كلورهيديرات 40 مغ/مل، محلول قطرات للشرب، 20 مل

## الشكل والعرض:

محلول قطرات للشرب، قارورة 20 مل، 1 مل من محلول الشرب  
= 20 قطرة = 40 مغ من العنصر الفعال  
\* كل قطرة من المحلول تعادل 2مغ من أميتيبيتيلين.

## التكوين:

أميتيبيتيلين كلورهيديرات.....4,528غ  
- سواغ : براهيدروكسي بانزوات مثيل وبروبيل، كحول، عطر  
الكرز، ماء مصفى ك.ك.ل.....100مل

## خصائص علاجية:

هذا الدواء يتطلب عدة أيام قبل أن يعطي مفعوله.

## دواعي الاستطباب:

- حالات الإنهيار العصبي  
- آلم مستعصية

**يُمكن وصف هذا الدواء أيضا:** في حالات سلس البول انطلاقا من 4 سنوات، بعد التأكد من أن التبول لا يعود الى أسباب عضوية.

## مضادات الاستطباب:

العلاج مبهديء، أعصاب، خطر حدوث زرق العين بزواية مغلقة.  
اضطرابات بروتاتنية تجعل التبول صعبا.  
\*في حال الشك، لا بد من استشارة الطبيب أو الصيدلي.

## احتياطات الاستعمال:

- لا ينصح بتناول المشروبات الكحولية في فترة العلاج.  
- من المهم اعلام الطبيب.

• إذا كنت تعاني من اضطرابات قلبية أو من البروستات.  
• إذا تعرضت في السابق لاختلاجات أو إذا كنت تعاني من

الارتفاع في الضغط الدموي.

• إذا كانت المرأة حاملا أو إذا كانت تريد الحمل.  
- لا ينصح بالارضاع أثناء فترة العلاج.

## التفاعلات الدوائية:

لتفادي التداخلات المحتملة بين عدة أدوية يجب تلقائيا اعلام الطبيب أو الصيدلي بأي علاج آخر تتلقاه في نفس الوقت.

## الآثار الأخرى الممكنة للدواء:

مثل أي مستحضر نشط قد يسبب هذا الدواء لدى بعض الأشخاص، بعض الازعاج مثل:

جفاف الفم، انخفاض ضغط الدم عند تغيير وضعية الجلوس بشكل مفاجيء، الإمساك أو عسر البول،

النعاس أو التهيج، اضطرابات بصرية قد تجعل قيادة السيارات أو إستعمال الآلات خطيرة.

## الجرعة وطريقة الاستعمال:

الصفات العلاجية لهذا الدواء تسمح بجرعة واحدة يومية خلال فترات الأكل.

يصف الطبيب الجرعة التي تناسب حالتكم، تقيدوا تقيدا صارما بوصفة الطبيب ولا تزيدوا الجرعة ولا توقفوا العلاج بدون رأي الطبيب حتى ولو أحسستم بالتحسن.

شروط التوزيع: لا يعطى هذا الدواء إلا بوصفة طبية.  
حفظ الدواء: بين 15م° و 30م° في تعبته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 16 / 98 / 16A003 / 073  
هذا الدواء، لا تتركه في متناول الأطفال



مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75أ الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com