

ISOCTINE®

Cyproheptadine chlorhydrate
2mg/5ml Solution buvable 100ml

COMPOSITION :

Cyproheptadine chlorhydrate	0.0430 g
Parahydroxybenzoate de méthyle sodé	0.0333g
Parahydroxybenzoate de propyle sodé	0.0166g
Excipients aromatisés, (arôme de banane)	100 ml

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des manifestations allergiques aiguës ou chroniques telles que : rhinite saisonnière ou persistante, rhinite vasomotrice, urticaire, œdème angioneurotique, conjonctivite allergique, réactions allergiques modérées aux piqûres d'insectes.
- Traitement adjuvant symptomatique des affections dermatologiques telles que : eczéma, prurit anogénital, prurit secondaire à la varicelle.
- Stimulation de l'appétit chez le malade présentant une diminution de l'appétit accompagnée d'une perte du poids.

CONTRE-INDICATIONS :

- Enfant de moins de 2 ans.
- Traitement des attaques aiguës d'asthme.
- Hypersensibilité à la Cyproheptadine et aux médicaments ayant une formule chimique voisine.
- Glaucome à angle fermé.
- Ulcère peptique sténosant.
- Hypertrophie prostatique symptomatique.
- Sujets âgés, malades débilités.
- Traitement : par les IMAO.
- Allaitement : les antihistaminiques sont contre-indiqués chez la femme allaitant.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

- Les IMAO prolongent et intensifient les effets anticholinergiques des antihistaminiques.
- Les antihistaminiques peuvent avoir des effets additifs avec l'alcool et d'autres déprimeurs du système nerveux central.

EFFETS INDESIRABLES :

- Système nerveux central : sédation, somnolence, étourdissement, agitation, nervosité, convulsions, hallucinations, faiblesse.
- Dermatologie : Transpiration, photosensibilisation.
- Hypertension.
- Sécheresse de la bouche, anorexie, nausées, vomissements, diarrhée, constipation.
- Fatigue, frisson, céphalée.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Les antihistaminiques ne doivent pas être utilisés pour le traitement de symptômes broncho-pulmonaires.
- L'absorption des boissons alcoolisées pendant le traitement est déconseillée.
- L'attention est attirée chez les conducteurs et les utilisateurs de machines.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

-Allergie et prurit :

- Adultes** : 4 à 20 mg/jour, réparties en 3 fois/jour
- Enfants** : 2-6 ans : 2 mg : 2-3 fois/jour.
-7-14 ans : 4mg : 2-3 fois/jour.

-Stimulation de l'appétit :

- Enfants de 2 à 6 ans** : ne jamais dépasser 8 mg/jour.
 - Enfants 7-14 ans** : ne jamais dépasser 12 mg/jour.
 - Adultes** : La dose quotidienne de 12 mg est habituellement satisfaisante en 2 à 3 fois/jour.
- Il est important de mesurer la quantité de sirop administrée.
- 1 cuillère à café = 5 ml = 2 mg de Cyproheptadine.

CONSERVATION:

entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 04/2018

N° d'enregistrement : 18/98/14F024/073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

LISTE : II

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel:031.95.01.74/79 - Fax : 031.95.01.80
<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E-mail : isopharm@gmail.com



إيزوكتين ©

سيبروهيبتادين كلورهيدرات
2مغ/5مل محلول للشرب 100 مل

التكوين:

سيبروهيبتادين كلورهيدرات	0.0430 غ
-براهيدروكسي بنزوات الميثيل صودي	0.0333 غ
-براهيدروكسي بنزوات البروبيل صودي	0.0166 غ
-سواغ معطر، (عطر الموز)، ك ك ل	100 مل

الاستجابات:

- معالجة أعراض الحساسية الحادة أو المزمنة بما في ذلك، التهابات الأنف الموقّعة أو الدائمة، الرمد، التفاعلات الحساسية الناتجة عن لدغ الحشرات.
- معالجة أعراض التهابات الجلدية والحكاقات، كإلتهاب المجري البولي والتناسلي، الإكزيما والحكاك الناتج عن جدي الماء.
- فتح الشهية لفاقديهي والمعاانون من نقص الوزن.

طريقة الإستعمال:

- للكبار: 4-20 مغ في اليوم: 3 مرات في اليوم.
- الصغار: 2-6 أعوام: 2 مغ: 3-2 مرات في اليوم.
- 14-4 عام: 4 مغ: 3-2 مرات في اليوم.

لفتح الشهية:

- الصغار: من 6-2 أعوام لا تتعدى 8 مغ في اليوم: 3-2 مرات في اليوم.
- 14-7 عام لا تتعدى 12 مغ في اليوم: 3-2 مرات في اليوم.
- الكبار: جرعة ل 12 مغ يوميا، تكون كافية، موزعة من 3-2 مرات في اليوم.

ملاحظة:

- من الضروري قياس جرعة الدواء
- 1 ملعقة قهوة = 5 مل = 2 مغ من السيبروهيبتادين.

الحفظ: بين 15°م و 30°م في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2018/04

رقم التسجيل: 18/98/14F024/073

لا تترك الدواء في متناول الأطفال

قائمة: II

مخابر إيزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحومن ص.ص 751 الخروب - قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.01.74/79 - الفاكس: 031.95.01.80

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

