

CITICOLINE-ISO®

Citicoline sodique 100mg/ml, solution pour gouttes buvables 50 ml

FORME ET PRÉSENTATION:

Solution pour gouttes buvables.

Flacon de 50 ml.

1 ml = 100 mg de principe actif.

COMPOSITION :

Citicoline sodique (DCI) 10gr

Excipients : Phb méthyle et propyle sodés, saccharine sodique, QSP 100ml

PROPRIÉTÉS :

La citicoline stimule la biosynthèse des phospholipides structuraux de la membrane neuronale. La citicoline au moyen de cette action améliore la fonction des mécanismes de membrane, tel que le fonctionnement des pompes à échange ionique et les récepteurs qui y sont insérés, dont la modulation est indispensable dans la neurotransmission. Des essais cliniques ont démontré que la citicoline améliore les symptômes dans des situations d'hypoxie et d'ischémie cérébrale, telle que : perte de mémoire, labilité émotionnelle, manque d'initiative, difficultés pour les activités de la vie quotidienne et le soin personnel.

Des essais cliniques ont également mis en évidence l'efficacité de la citicoline dans le traitement des troubles cognitifs, sensitifs, moteurs et neuropsychologiques d'étiologie dégénérative ou vasculo-cérébrale.

INDICATIONS :

Traitement des troubles cognitifs, sensitifs, moteurs et neuropsychologiques d'étiologie dégénérative ou vasculo-cérébrale.

POSOLOGIE :

Voie orale. Réservé à l'adulte et à l'enfant.

Administer le produit à l'aide de la seringue doseuse préalablement mélangé à de l'eau.

Adultes : 200 mg (2ml), 3 fois par jour.

Enfants : 100 mg (1ml), 2-3 fois par jour.

Chaque ml (20 gouttes) contient 100 mg de citicoline. Ces doses pourront être modifiées selon le critère du médecin.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne doit pas être administrée chez les patients à hypertension du parasymphatique.

EFFETS SECONDAIRES:

On n'a décrit que très peu de cas de légers troubles gastro-intestinaux.

INCOMPATIBILITÉ :

Ne doit pas être administrée conjointement avec des médicaments contenant du méclophénoxate.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

Citicoline-iso® renforce les effets de la L-Dopa.

INTOXICATION ET SON POSSIBLE TRAITEMENT :

Etant donné la rare toxicité de la préparation, on ne prévoit pas l'intoxication. En cas de surdosage accidentel, instaurer un traitement symptomatique.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

Ce médicament est délivré sur ordonnance (**LISTE: I**)

CONSERVATION:

Entre 15 ° et 30 ° dans son emballage d'origine.

Date de révision : 06/2018

N° d'enregistrement : 18/09/15K 045/073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P. : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.01.74/79 Fax : 031.95.01.80

<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



سيتيكولين - إيزو[®]

سيتيكولين صوديك 100مغ/مل ، محلول قطرات للشرب 50 مل

الكبار: 200مغ (2 مل)، 3 مرات في اليوم.
الأطفال: 100مغ (1مل)، 2-3 مرات في اليوم.
هذه الجرعات يمكن أن تتغير حسب تقدير الطبيب المعالج.

مضادات الإستطباب:

لا يجب تناوله من طرف المرضى ذوي التنبيه الزائد في الجهاز شبه السمبثاوي.

الأعراض الجانبية:

لم يتم تسجيل إلا حالات شاذة لإضطرابات معدية-معوية خفيفة.

عدم التوافق:

لا يتناول في نفس الوقت مع الأدوية التي تحتوي على الميكلوبينوكسات.

التفاعلات الدوائية:

سيتيكولين-إيزو يقوي آثار L-DOPA.

التسمم و علاجه الممكن:

نظرا للمفعول السام النادر للتركيب، لا يتوقع حالات تسمم. في حالة تجاوز الجرعة دون إرادة، يجب متابعة علاج حسب الأعراض.

شروط التوزيع:

لا يباع إلا بوصفة طبية (لائحة: I).

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2018/06

رقم التسجيل: 18/09/15K 045/073

هذا دواء، لا تتركه في متناول الأطفال

الشكل و التقديم:

محلول قطرات للشرب

قارورة 50 مل

1مل من المحلول=100مغ من العنصر الفعال.

التركيب:

سيتيكولين صوديك (DCI) 10غ
سواغ: براهيدروكسي بنزوات المثيل و البروبيل صودي، سكارين صوديك، ك.ك.ل 100مل

الخصائص:

السيتيكولين تحفز التركيب البيولوجي للفوسفودهنات التركيبية للغشاء العصبي.

السيتيكولين بواسطة هذا التحفيز تحسن وظيفة آليات الغشاء، كعمل مضادات التبادل الأيونية و المستقبلات المدرجة فيه، و الذي يكون فيه التعديل ضروري في عملية النقل العصبي.

أثبتت تجارب مخبرية -عيادة، بأن السيتيكولين تحسن الأعراض في حالات نقص الأكسجة على مستوى المخ: كفقان الذاكرة، الثقل الإنفعالي، نقص المبادرة و صعوبة القيام بالنشاطات اليومية و العناية الشخصية.

بعض التجارب المخبرية-العيادة، قد سلطت الضوء أيضا على فعالية السيتيكولين في علاج اضطرابات الإدراك، الإضطرابات الحسية، الحركية و الفسيولوجية العصبية للمسببات المرضية التنكسية أو الشريانية-الدماعية.

الإستطباب:

علاج إضطرابات الإدراك، الإضطرابات الحسية، الحركية و الفسيولوجية العصبية للمسببات المرضية التنكسية أو الشريانية-الدماعية.

المقادير:

عن طريق الفم

مخصص للكبار و الصغار.

يؤخذ الدواء عن طريق حقنة القياس المرفقة و يمزج مع الماء.

مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75أ الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.01.74/79 - الفاكس: 031.95.01.80

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com

