

# MUCOLYSE® Adulte

Carbocistéine 5% Solution buvable 150 ml

## FORME ET PRÉSENTATION :

Solution buvable  
Flacon de 150 ml  
5ml de solution buvable = 250 mg de principe actif = 1  
cuillère à café

## COMPOSITION :

-CARBOCISTÉINE (DCI) ..... 5gr  
-Excipients : Hydroxyde de sodium,  
Parahydroxybenzoate de méthyle, Arôme de banane,  
colorant (E 122), Saccharose, eau ..... Q.S.P ..... 100ml

## PROPRIÉTÉS :

Des études réalisées chez l'animal ou chez l'homme ont permis de mettre en évidence le mécanisme d'action mucorégulateur de la carbocistéine.

-Activation de la sialytransférase avec augmentation du taux des sialomucines du mucus et rétablissement d'un profil sécrétoire normal,

-Augmentation du taux des IgA sécrétoires,  
-Restauration des groupements SH de la muqueuse bronchique.

Cliniquement la carbocistéine a un effet mucolytique vivo confirmé par :

-L'amélioration des quantités rhéologiques du mucus respiratoire,  
-La normalisation du transport mucociliaire par action sur mucus et muqueuse,  
-La baisse des résistances des voies aériennes.

Par ces propriétés la carbocistéine est un muco-protecteur des voies respiratoires :

-Protection de l'épithélium cilié.  
-Réduction de l'hyperplasie mucipare.

Par ailleurs, la carbocistéine favorise la pénétration de certains antibiotiques au niveau des sécrétions de la muqueuse respiratoire.

Ainsi la carbocistéine améliore la mobilité des sécrétions pathologiques, ce qui facilite l'expectoration et libère les voies aériennes.

## INDICATIONS :

Traitement des affections des voies respiratoires s'accompagnant d'anomalies du mucus. En particulier

-En pneumologie : bronchites aiguës, bronchites chroniques.  
-En ORL : rhinites, sinusites.

## CONTRE - INDICATIONS :

Ulcère gastroduodéal

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 15 ans ;  
- Chez les diabétiques, tenir compte de la quantité de saccharose par unité de prise : 4 gr par cuillère à soupe.

## EFFETS INDÉSIRABLES :

A forte dose (4 cuillères à soupe par jour), on peut parfois constater l'apparition des troubles digestifs gastralgies, nausées, cédat généralement lors de la réduction de la posologie.

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Voie orale  
1 cuillère à soupe = 750 mg de carbocistéine.  
Posologie usuelle : 3 cuillères à soupe par jour en moyenne.

## DURÉE DE TRAITEMENT CONSEILLÉE :

- Affections aiguës des voies respiratoires : 8 à 10 jours ;  
- Affections récidivantes de la sphère ORL ou bronchique : de 10 jours à 3 semaines, à répéter plusieurs fois par an ;  
Une augmentation de l'expectoration peut être observée dès les premiers jours ; elle traduit l'amélioration de la mobilité des sécrétions pathologiques.  
Aucun risque d'inondation bronchique aux doses usuelles.

## CONSERVATION :

Entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N°d'enregistrement : 06 / 20 D 042 / 073

**Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants**

## LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com



# ميكوليز® للكبار

كربوسيستين 5% محلول للشرب 150 مل

الشكل والتقديم:

محلول للشرب، قارورة 150 مل.

5 مل من المحلول = 250 مغ من العنصر الفعال = ملعقة قهوة.

التكوين:

كربوسيستين.....5غ

سواغ: هيدروكسيد الصوديوم، براهيدروكسي بنزوات ممتل،

عطر الموز، مادة ملونة (E 122)، سكر، ماء.....ك

ك ل.....100 مل

الخصائص:

الكربوسيستين حال للمخاط، يسهل على طرده وبالتالي

يساعد على إخراج الإفرازات المخاطية، تهوية القصبات

الهوائية والشفاء.

الكربوسيستين تساعد كذلك على دخول بعض المضادات

الحوية على مستوى الإفرازات المخاطية الهوائية .

دواعي الاستعمال:

معالجة أمراض المجاري التنفسية المصحوبة بصعوبة إفراز

المخاط بالخصوص :

- في أمراض الرئة: التهاب القصبات الهوائية (حاد أو مزمن).

- في أمراض الأذن و الأنف و الحنجرة: التهاب مخاطية

الأنف، التهاب الجيب.

موانع الاستعمال:

قرح معدني، عفجي.

احتياطات الاستعمال:

- لا يستعمل عند الطفل أقل من 15 سنة.

تأثيرات جانبية:

عند زيادة الجرعة (4 ملاعق أكل في اليوم):

يمكن ظهور بعض الأعراض مثل: تزمّت المعدة، غثيان، قيء،

إسهال، يرجى تخفيض الجرعات.

المقادير وطريقة الاستعمال:

- عن طريق الفم، خاص بالكبار (أكثر من 15 سنة).

- ملعقة أكل = 15 مل = 750 مغ من الكربوسيستين.

- المقادير المعتادة: 3 ملاعق أكل في اليوم.

مدة العلاج:

- في حالة الأمراض الحادة للقنوات الهوائية: من 8 إلى 10

أيام.

- في حالة الأمراض الراجعة لمنطقة الأنف و الأذن و الحنجرة

أو القصبات: من 10 أيام إلى 3 أسابيع، مع إعادة العلاج عدة

مرات في السنة.

يمكن ملاحظة زيادة في التنخم خلال الأيام الأولى للعلاج،

وهذا يعني تحسن حركة الإفرازات المرضية.

لا يوجد أي خطر لزيادة الإفرازات القصبية عند إتباع المقادير

العادية.

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 06/20D 042/073

هذا الدواء، لا تتركه في متناول الأطفال

مخابر إيزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب - قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

