

ISOSPALGINE®

Tiémonium méthyl-sulfate 2mg / ml, solution buvable 150ml

FORME ET PRESENTATION:

Solution buvable. Flacon de 150 ml.

1 cuillère à café = 5ml de solution = 10 mg de principe actif.

COMPOSITION :

Tiémonium (DCI) Méthylsulfate 200 mg

Excipients : Parahydroxybenzoate de Méthyle sodé, de Propyle sodé, arôme de banane, eau qsp 100 ml

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

Antispasmodique mixte :

- Musculotrope
- Anticholinergique

INDICATIONS :

- Traitement symptomatique des manifestations douloureuses aiguës liées à des troubles fonctionnels du tube digestif et des voies biliaires.
- Traitement symptomatique des manifestations douloureuses en gynécologie
- Traitement symptomatique des manifestations spasmodiques et douloureuses des voies urinaires.

CONTRE INDICATIONS :

- Troubles urétrorostatiques avec risque de rétention urinaire.
- Risque de glaucome par fermeture de l'angle.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

•**Grossesse:** les résultats des études du tiémonium

réalisées chez l'animal n'ont pas mis en évidence d'effets tératogènes. Bien que ceux-ci ne préjugent pas de l'effet dans l'espèce humaine, aucune malformation n'a été rapportée à ce jour au cours de l'utilisation courante.

•**Allaitement:** Chez la femme qui allaite, en l'absence de données suffisantes, la prudence est de règle, bien qu'aucun problème n'ait été signalé au cours de l'utilisation courante.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Voie orale :

•**Enfant:** 3 cuillères à café par 5 kg de poids et par jour

•**Adulte:** 1 à 3 cuillères à soupe 3 fois par jour

NB.: L'action de la forme orale peut être complétée par l'adjonction de 1 à 2 suppositoires par 24H.

SURDOSAGE :

Symptômes : apparition d'effets atropiniques : sécheresse de la bouche, constipation, tachycardie, confusion mentale chez les sujets âgés.

Traitement : évacuation du toxique. Traitement symptomatique en milieu spécialisé avec surveillance cardiaque et respiratoire.

Liste II

CONSERVATION:

entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N° d'enregistrement : 09 / 00 / 10 D032 / 073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants.

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P. : Z.J TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07
<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



إيزوسبالجين

تيمونيوم ميثيل سولفات 2 مغ/ مل، محلول للشرب 150 مل

الشكل والتقديم:

محلول للشرب، قارورة ذات 150 مل. ملعقة قهوة
= 5 مل من المحلول = 10 مغ من العنصر الفعال.

التركيب:

تيمونيوم ميثيل سولفات.....200مغ
سواغ: براهيدروكسي بنزوات ميثيل صودي، بروبيل
صودي، عطر الموز، ماء، ك ك ل100 مل

التصنيف الصيدلاني- العلاجي:

مضاد للتشنجات (مسكن للألام ومضاد لإفراز مادة
الكولين)

الاستطباب:

•آلام الأمراض الهضمية والصفراوية.
•أمراض النساء، و أمراض المسالك البولية.

مضادات الاستطباب:

•اضطرابات البروستات والمثانة.
•زرق العين بزاوية مغلقة.

الحمل والرضاعة:

•الحمل: نتائج دراسات التيمونيوم المجرة على
الحيوان لم تظهر أي تشوهات جنينية، و لم تسجل
أي تشوهات عند الإنسان جراء إستعمال هذا الدواء
و لكن هذا لا يبرر عدم وجود أي تأثير على الإنسان.

•الرضاعة: بالرغم من أنه لم تسجل أي مشكلة عند

استعماله من طرف المرأة المرضعة ولكن في غياب
معطيات كافية يجب الحذر عند استعمال هذا
الدواء.

إذا إستلزم الأمر يجب استشارة الطبيب أو الصيدلاني

المقادير وكيفية الاستعمال:

عن طريق الفم

•الطفل: 3 ملاعق قهوة / 5 كغ من الوزن/ اليوم.

•البالغ: 1-3 ملاعق أكل، 3 مرات في اليوم.

ملاحظة: في بعض الحالات بإمكانك تقوية فعالية

الدواء باستعمال 1 إلى 2 تحميلات من تيمونيوم/ 24
ساعة.

جرعة مفرطة:

•جفاف الفم، قبض، إلتباس فكري عند المتقدم في
السن، خفقان القلب.
•المعالجة في وسط استشفائي.

قائمة II

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 09/00/10 D 032 /073

لا يترك الدواء في متناول الأطفال.

مخابر إيزوفارم الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب - قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

