

ISOBUTALINE®

Terbutaline sulfate 30mg/100ml, Solution buvable 150ml, Sans sucre

FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable 150ml

5ml = 1,5mg principe actif = 1 cuillère à café

COMPOSITION :

Terbutaline sulfate 30mg

Excipients aromatisés, (arôme de banane), qsp 100ml

PROPRIÉTÉS :

Isobutaline est un broncho-dilatateur par stimulation des récepteurs beta – 2 adrénergiques dans les poumons ce qui relaxe les muscles lisses bronchiques et soulage ainsi le bronchospasme, augmente la capacité vitale, diminue le volume résiduel et la résistance des voies aériennes.

En tant qu'inhibiteur de l'accouchement prématuré Isobutaline agit principalement en tant que stimulant des récepteurs beta adrénergiques pour relaxer les muscles de l'utérus inhibant ainsi les contractions utérines.

INDICATIONS :

Isobutaline est indiqué dans le traitement symptomatique de l'asthme bronchique et des bronchospasmes réversibles associés à une bronchite, un emphyseme pulmonaire, une bronchectasie et d'autres maladies pulmonaires obstructives.

Isobutaline peut également être administré dans la prophylaxie et le traitement de l'accouchement prématuré.

CONTRE-INDICATIONS :

Hypersensibilité au terbutaline et à d'autres agents sympathomimétiques.

MISES EN GARDE

Le rapport bénéfice/risque devra être évalué dans les cas suivants

-Pathologie cardio-vasculaire y compris arythmie cardiaque, insuffisance coronarienne ou hypertension.

-Hyperthyroïdisme, phéochromocytome diagnostiqué ou suspecté, antécédents de convulsion, diabète sucré.

-insuffisance rénale.

PRÉCAUTIONS :

Il est recommandé de surveiller les concentrations sériques en potassium pendant le traitement par la terbutaline chez les patients susceptibles d'avoir une hypokaliémie.

UTILISATION PENDANT LA GROSSESSE :

L'effet sur le fœtus humain n'est pas connu. Terbutaline traverse le placenta, pour cela le rapport bénéfice/risque devra être évalué avant d'administrer terbutaline aux femmes enceintes.

UTILISATION PENDANT L'ALLAITEMENT :

Terbutaline est distribué dans le lait maternel, pour cela la terbutaline doit être administrée avec prudence chez la femme allaitante.

EFFETS INDÉSIRABLES :

Les plus fréquents : tachycardie, changement dans la tension artérielle, nervosité, tremblement, palpitation et impatience.

Les moins fréquents : étourdissement, somnolence, céphalées, sueur augmentée, crampes musculaires ou contractions, nausée, troubles de sommeil, faiblesse, gout inhabituel.

POSOLOGIE :

Dose adulte habituelle :

-broncho-dilatation : 7.5ml à 15ml 3 fois par jour administrées à interval de 6 heures. La dose limite habituelle chez l'adulte est de 15mg par jour.

-Inhibition de l'accouchement prématuré: Terbutaline est apportée en dose de 2.5 mg toutes les quatre à six heures jusqu'à l'accouchement.

Dose pédiatrique habituelle :

Broncho dilatation :

-**Enfants de moins de 3 ans:** 0.25ml/Kg 3 fois/jour.

-**Enfant 3 à 6 ans:** 2.5ml de sirop trois fois/jour.

-**Enfant de 7 ans à 11ans:** 5 ml de sirop trois fois/jour.

-**Enfant de 12 ans à 15ans :** 7.5 ml trois fois/jour administrées à interval de 6 heures. La posologie ne doit pas dépasser 7.5 mg/jour.

SURDOSAGE :

Le traitement du surdosage consiste à diminuer la posologie ou à arrêter le traitement. Le traitement d'appoint prend la forme d'un lavage gastrique après avoir provoqué des vomissements chez les patients conscients. Administrer une suspension de charbon activé, maintenir une respiration adéquate et surveiller les fonctions cardiaque et respiratoire.

CONDITIONS DE DÉLIVRANCE :

Ce médicament est délivré uniquement sur ordonnance (liste I)

CONDITIONS DE CONSERVATION :

entre 15 °C et 30 °C à l'abri de la lumière, dans son emballage d'origine.

Date de révision : 04/2018

N° d'enregistrement : 18/10/20A 049/073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P. : Z.I.TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.01.74/79 - Fax : 031.95.01.80

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com



إيزوبيتالين[®]

كبريتات تيريبیتالين 30 مغ/100 مل محلول للشرب 150 مل، بدون سكر

الشكل والتقديم:

محلول للشرب 150 مل.
مل = 1.5 مغ من المادة الفاعلة = ملعقة قهوة.

التكوين:

كبريتات تيريبیتالين 30 مغ.
سواغ معطر، (عطر الموز) ك.ك.ل 100 مل.

الخصائص:

إيزوبیتالين موسع قصبي يحث بيتا 2 أدرينالية الإثارة في الرئتين فيرخي العضلات للمساء للقصبات. وبهذا فهو يفرج الشنج القسبي و يزيد السعة الحياتية و يقلل الحجم الثمالي و مقاومة المسالك الهوائية.
كما أن إيزوبیتالين مثبط للولادة المبكرة، يعمل بشكل رئيسي على حث مستقبلات بيتا أدرينالية الإثارة في عضلات الرحم و بذلك يبطئ تقلصاته.

الإستيبات:

يستعمل إيزوبیتالين لعلاج أعراض الربو القسبي و لعلاج الشنج القسبي العكوس المصاحب للإنتهاب القصبات، النفاخ الرئوي، توسع القصبات و أمراض الإسداد الرئوي الأخرى.
يستعمل إيزوبیتالين في الوقاية من الولادة المبكرة و علاجها.

مضادات الإستطباب:

فرط التحسس لتيريبیتالين أو للأدوية الأخرى المحاكية للودي.

التحذيرات:

يجب موازنة الإخطار الكامنة مع الفوائد المرجوة في الحالات التالية:
- أمراض الجهاز القلبي الوعائي بما في ذلك اضطراب نظم القلب و القصور الكلبي و ارتفاع ضغط الدم.
- فرط الدرقية، ثبوت تشخيص ورم القواتم أو احتمال به، سيرة مرضية من نوبات الصرع، داء السكري.
- ضعف الوظيفة الكلوية.

الإحتياطات:

ينصح بقياس تركيز بوتاسيوم في المصل خلال العلاج لدى المرضى الذين لديهم استعداد للإصابة بنقص البوتاسيمية.

الإستعمال في حالة الحمل:

تأثير الدواء على الجنين الادمي غير معلوم. يعبر تيريبیتالين المشيمة، لذلك يجب موازنة المخاطر الكامنة مع الفوائد المرجوة قبل إعطاء تيريبیتالين للنساء الحوامل.

الإستعمال في حالة الرضاعة:

يتوزع تيريبیتالين في حليب الام، لذلك يجب أخذ الحيطة عند إعطاء هذا الدواء للنساء المرضعات.

الأثار الجانبية:

الأثار الأكثر شيوعا: زيادة في سرعة القلب، تغيرات في الضغط الدموي، عصبية، رعشة، خفقان، تلململ.

الأثار الأقل شيوعا: دوام، تعاس، صداع، زيادة في التعرق، نفضان العضلات، اضطرابات في النوم، غثيان، ضعف، طعم غير عادي.

الجرعة:

*الجرعة الاعتيادية للبالغين:

- توسيع القصبات: 7.5 إلى 15 مل ثلاث مرات يوميا، تؤخذ على فترات كل 6 ساعات و يبلغ الحد الاعلى للجرعة عند البالغين 15 مغ خلال أربع و عشرون ساعة.

- تثبط الولادة المبكرة: يعطى 2,5 مغ إيزوبیتالين كعلاج داعم كل أربع إلى ست ساعات إلى أن يحين موعد الولادة الطبيعية.

* الجرعة الاعتيادية للأطفال:

- الأطفال الأقل من ثلاث سنوات: 0.25 مل/كغ 3 مرات في اليوم.
- الأطفال من 3 إلى 6 سنوات: 2.5 مل من الشراب ثلاث مرات يوميا.
- الأطفال من 7 إلى 11 سنة: 5 مل من الشراب ثلاث مرات يوميا.
- الأطفال من 12 إلى 15 سنة: 7.5 مل ثلاث مرات يوميا، تؤخذ على فترات كل 6 ساعات، على أن لا تتعدى الجرعة الكلية 7.5 مغ يوميا.

فرط الجرعة:

يتضمن علاج فرط الجرعة خفض جرعة تيريبیتالين أو إيقاف العلاج به. العلاج الداعم يتضمن غسيل المعدة مسبوفا بإحداث القيء إذا كان المريض يقضا، و يعطى الفحم المنشط مع المحافظة على تنفس كاف و مناصرة القلب و التنفس.

صرف الدواء:

لا يصرف هذا الدواء الا بوصفة طبية (لائحة 1)

الحفظ: بين 15°م و 30°م بعيداً عن الضوء، في تعبته الأصلية.
تاريخ المراجعة: 2018/04

رقم التسجيل: 18/10/20A 049/073

لا يتك الدواء في تناول الأطفال.

مخابر إيزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75أ الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف/031.95.01.74/99 - الفاكس: 031.95.01.80

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com