

RABWALYSE®

Salbutamol sulfate 2mg / 5 ml, solution buvable 150 ml

FORME ET PRÉSENTATION

Solution buvable

Flacon de 150 ml

1 cuillère mesure = 5ml de solution buvable = 2 mg de principe actif.

COMPOSITION :

- Salbutamol (DCI) sulfate exprimé salbutamol.....40mg

Excipients : acide citrique, parahydroxybenzoate de méthyle, saccharose, arôme de banane, eau.....Q.S.P100 ml

CLASSE PHARMACO-THÉRAPEUTIQUE :

-Bronchodilatateur β_2 stimulant

(N : système nerveux central)

INDICATIONS :

- Traitement des crises d'asthme et d'autres bronchopneumopathies obstructives spasmodiques.

- Prévention de l'asthme d'effort.

- Bronchiolites du nourrisson.

-Toux spasmodique.

NON-INDICATIONS :

- dyspnée de l'insuffisance cardiaque.

- Etat de mal asthmatique.

CONTRE-INDICATIONS:

Allergie à l'un des constituants

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

- salbutamol doit être utilisé avec prudence chez les malades atteints d'hyperthyroïdie, des troubles coronariens, des troubles du rythme ventriculaire graves, de myocardiopathie obstructive, d'hypertension artérielle, de diabète sucré.

- La prescription du salbutamol implique une réduction des éventuelles thérapeutiques sympathomimétiques associées.

- grossesse : salbutamol ne sera pas prescrit au cours du premier trimestre de la grossesse, qu'en cas de nécessité.

-5 ml de la solution buvable contiennent 2.5 gr de saccharose.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

5 ml de solution buvable contiennent 2 mg de salbutamol.

Enfant : 0.20 à 0.30 mg / kg/jour, soit

- de 1 mois à 2 ans : 2.5 ml, 2 à 3 fois par jour

- de 2 ans à 6 ans : 2.5 ml à 5 ml, 3 à 4 fois par jour.

- au dessus de 6 ans : 5 ml, 3 à 4 fois par jour.

Adulte : 0.10 à 0.20 mg / kg / jour, soit :

- 5 à 10 ml 3 à 4 fois par jour.

- chez les sujets âgés ou chez les sujets très réactifs aux bêta 2 mimétiques, il est préférable de débiter par 1 cuillère-mesure (5ml) 3 à 4 fois par jour.

PRÉVENTION DE L'ASTHME D'EFFORT :

- enfant : 5 ml, 2heures avant l'effort.

- Adulte : 10 ml, 2heures avant l'effort.

EFFETS NON SOUHAITÉS GÉNANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAÎNER DES EFFETS PLUS OU MOINS GÉNANTS:

- tremblement d'origine musculaire prédominant aux extrémités. Ces tremblements paraissent rares chez l'enfant.

- Une tachycardie peut s'observer à fortes doses.

- Des troubles digestifs (nausées et vomissements), ainsi que des céphalées ont été signalés.

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas de surdosage, sont amplifiés ; tremblements, tachycardie, modifications tensionnelles, sueurs, nervosité.

Traitement : en cas d'intoxication grave, évacuer l'estomac et, si nécessaire administrer au milieu hospitalier un bêta-bloquant avec la prudence qui s'impose chez les sujets ayant tendance au bronchospasme

Liste I

CONDITIONS DE DELIVRANCE:

Uniquement sur ordonnance médicale.

CONSERVATION:

Entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N°d'enregistrement : 16 / 05 / 20A016 / 073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I.TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



ربواليز^ع

سالييتامول سولفات 2 مغ / 5 مل، محلول للشرب 150 مل

الشكل والتقديم:

محلول للشرب، قارورة ذات 150 مل.

كل ملقعة قياس = 5 مل من محلول الشرب = 2 مغ من العنصر الفعال

التركيب:

سالييتامول..... 40 مغ
سواغ: حامض ليونيك، براهيدروكسي بنزوات مثيل، سكروز، عطر الموز، ماء. ك ل ل... 100 مل

التصنيف الصيدلي:

موسع لقصبة الرئة $\beta 2$ مننشط.

الجهاز العصبي المركزي (N).

الإستطباب:

- معالجة نوبات الربو والتهابات القصبات و الرئة التشنجية الإندسادية.

- الوقاية من ربو الجهد.

- إتهاب القصبات الهوائية عند الرضيع.

- السعال التشنجي.

حالات عدم الاستعمال:

- عسر التنفس الناتج عن قصور قلبي.

- حالة الوجع الربوية.

لا للإستعمال:

حساسية لأحد المركبات.

احتياطات الاستعمال:

- سالييتامول يجب تناوله بحذر عند الأشخاص الحساسين ب: فرط التعرق، اضطراب

الأوردة، اضطراب في الاتزان البطني الخبطي، مرض نسيج القلب العضلي الإندسادي،

ارتفاع الضغط الشرياني، مرض السكر.

- استعمال سالييتامول يفرض إتقاص المقادير العلاجية للأعراض التكميفية للمشتركة.

- عدم إعطاء هذا الدواء بالاشتراك مع البيتا الحازجة الغير إنتقائية.

- الحمل: سالييتامول لا يمكن إعطاؤه في الثلاثي الأول من الحمل إلا في الحالات

الضادة.

- كل 5 مل من المحلول تحتوي على 2.5 مغ من السكروز

المقادير وكيفية الاستعمال:

كل 1 ملقعة = 5 مل من محلول للشرب = 2 مغ من العنصر الفعال.

الأطفال: من 0.20 إلى 0.30 مغ / كغ/ اليوم أي:

- من الشهر الواحد إلى ستان: 2.5 مل مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.

- من ستان إلى ست سنوات: 2.5 مل إلى 5 مل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم .

- ما فوق ست سنوات: 5مل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

الكبار: من 0.10 إلى 0.20 مغ/ كغ/ اليوم أي:

- 5 مل إلى 10 مل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

- عند كبار السن أوعند الأشخاص ذوي رد الفعل الإرتكاسي لبيتا التكميفي من

المستحسن البدء بـ 5 مل ثلاث إلى أربع مرات في اليوم.

للوقاية من ربو الجهد:

- الأطفال: 5 مل ساعتان قبل الجهد.

- الكبار: 10 مل ساعتان قبل الجهد.

تأثيرات غير مرغوبة:

- هزات عضلية مسيطرة على الأطراف ونادرا ما تكون عند الأطفال.

- تسارع نبضات القلب عند تناول جرعات كبيرة.

- إضطرابات في الهضم (غثيان- القيء) وصداغ.

ما يجب عمله في حالة جرعة مفرطة:

في حالة تناول جرعة مفرطة تتضخم الأعراض التالية: ارتعاش، تسارع نبضات القلب،

تغير في الضغط الدموي، التعرق، التعصب.

العلاج: في حالة تسمم خطير يجب إفراغ المعدة، من الأحسن علاجه يكون في

المستشفى بإعطاء بيتا- حازجة مع احتياط مفروض عند الأشخاص القابلين للتشنجات

القصية.

قائمة 1

شروط التوزيع: لا يعطى هذا الدواء إلا بوصفة طبية.

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 16 / 05 / 20A016 / 073

لا تترك الأدوية في متناول الأطفال

مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75أ الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com