

ISOMOL®

Paracétamol 100 mg / 5 ml - Solution buvable 100ml

FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable.

Flacon de 100 ml, avec Gobelet doseur.

5 ml de solution buvable = 100 mg de principe actif.

COMPOSITION :

Paracétamol 2.00 g

Excipients : P.E.G 400, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, parahydroxybenzoate de propyle sodé, saccharose, arôme caramel vanille, eau..... q.s.p 100 ml.

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antalgique Antipyrétique (N: système nerveux central).

INDICATIONS :

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et /ou des états fébriles.

CONTRE-INDICATIONS :

-Hypersensibilité au paracétamol ou à l'un des constituants, notamment aux parabènes (méthyle et propyle).

-Insuffisance hépatocellulaire.

EFFETS INDESIRABLES :

-Quelques rares cas d'accidents allergiques se manifestant en général par de simples rashes cutanés avec érythème ou urticaire. Toute réaction allergique nécessite l'arrêt du traitement.

-Quelques rares cas de thrombopénies ont été cités dans la littérature internationale.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique, et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydase-peroxydase.

MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Mise en garde :

Pour éviter un risque de surdosage, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.

Précaution d'emploi :

Chez un enfant traité par 60 mg /kg /jour de paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Cette présentation est réservée à l'enfant (soit environ de 1 mois à 12 ans).

Posologie usuelle :

la dose quotidienne de paracétamol recommandée est d'environ 60mg/kg/24h

soit environ 15mg/kg toutes les 6 heures sans dépasser 4 prises par jour

ou 10mg /kg toutes les 4 heures

Pour la mesure utiliser le gobelet doseur joint.

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieur à 10 ml / min) : l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

MODE D'ADMINISTRATION :

la solution peut être bue pure ou diluée dans une petite quantité de boisson (Eau, Lait, Jus de fruit)

CONSERVATION:

Entre 15 °C et 30 °C dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N° d'enregistrement : 03 / 03 B 006 / 073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

<http://www.isopharm-algerie.com> ~ E.mail : isopharm@gmail.com



إيزومول®

براسيتامول 100مغ/5مل - محلول للشرب 100مل

تنبيه: لتجنب الجرعة المفرطة يجب التأكد من عدم وجود البراسيتامول في تركيب الأدوية الأخرى المتناولة.

إحتياطات الإستعمال:

عند الطفل المعالج بـ 60 مغ / كغ/اليوم بالبراسيتامول، إستعمال دواء آخر مانع للحمى غير مرغوب إلا في حالة ثبوت عدم فعالية البراسيتامول.

المقادير وكيفية الاستعمال:

هذا التقديم مخصص للأطفال (أي حوالي شهر إلى 12 سنة).

المقادير المستعملة:

- الجرعة اليومية للبراسيتامول الموصى بها هي تقريبا 60مغ/كغ/اليوم أي تقريبا 15 مغ/كغ كل 6 ساعات دون تجاوز 4 جرعات في اليوم أو 10مغ/كغ كل 4 ساعات
- للقياس إستعمل كوب القياس المرفق

في حالة قصور كلوي حاد (كرياتينين أقل من 10 مل في الدقيقة) ترتفع الفترة الزمنية بين جرعة وأخرى إلى 8 ساعات على الأقل.

كيفية الإستعمال:

يمكن شرب المحلول وحده أو مخففا في كمية صغيرة من المشروبات (ماء، حليب، عصير الفواكه)

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 073 / 006 B 03/03

هذا الدواء ، لا تتركه في متناول الأطفال

الشكل والتقديم:

محلول للشرب

قارورة ذات 100 مل

وحدة قياس

5 مل من المحلول للشرب = 100 مغ من العنصر الفعال

التركيب:

-براسيتامول 2.00 غ

-سواغ: براهيدروكسي بنزوات مثيل صودي، براهيدروكسي بنزوات بروبييل صودي

سكروز، عطر كراميل فانيليا، ماء مصفى..... ك ك ل 100..... مل

التصنيف الصيدلاني العلاجي:

مسكن للألم، مانع للحمى [الجهاز العصبي المركزي (N)]

الاستطباب:

علاج أعراض الإصابات المصحوبة بالألم (خفيف أو متوسط) أو الحمى.

مضادات الإستطباب:

حساسية شديدة للبراسيتامول أو لإحدى المكونات خاصة براهيدروكسي

بنزوات مثيل أو بروبييل.

-قصور كبدي خلوي.

تأثيرات غير مرغوب فيها:

-بعض حالات الحساسية النادرة: طفوح جلدي بسيط مع طفح وردي أو

جلدي ذو بثور حكاكة مما يتطلب إيقاف العلاج.

-حالات شاذة جدا يمكن حدوث نقصان في الصفائح الدموية.

تفاعلات دوائية:

تناول البراسيتامول يؤثر سلبيا على تقويم حامض اليوريك الدموي بطريقة

حامض الفسفوتانقستيك وتقويم كمية السكر في الدم بطريقة الأكسدة.



مخابر ايزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com