

# ISOMOL®

Paracétamol 100 mg / 5 ml - Solution buvable 100ml

## FORME ET PRESENTATION :

Solution buvable.

Flacon de 100 ml, avec Gobelet doseur.

5 ml de solution buvable = 100 mg de principe actif.

## COMPOSITION :

Paracétamol ..... 2.00 g

Excipients : P.E.G 400, parahydroxybenzoate de méthyle sodé, de propyle sodé, saccharose, arôme caramelle vanille, eau..... q.s.p 100 ml.

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :

Antalgique Antipyrétique (N: système nerveux central).

## INDICATIONS :

Traitement symptomatique des douleurs d'intensité légère à modérée et /ou des états fébriles.

## CONTRE-INDICATIONS :

-Hypersensibilité au paracétamol ou à l'un des constituants, notamment aux parabènes (méthyle et propyle).

-Insuffisance hépatocellulaire.

## EFFETS INDESIRABLES :

-Quelques rares cas d'accidents allergiques se manifestant en général par de simples rashes cutanés avec érythème ou urticaire. Toute réaction allergique commande l'arrêt du traitement.

-Quelques rares cas de thrombopénies ont été cités dans la littérature internationale.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES :

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin par la méthode à l'acide phosphotungstique, et le dosage de la glycémie par la méthode à la glucose-oxydase-peroxydase.

## MISES EN GARDE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI :

### Mise en garde :

Pour éviter un risque de surdose, vérifier l'absence de paracétamol dans la composition d'autres médicaments.

### Précaution d'emploi :

Chez un enfant traité par 60 mg /kg /jour de paracétamol, l'association d'un autre antipyrétique n'est justifiée qu'en cas d'inefficacité.

## POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI :

Cette présentation est réservée à l'enfant (soit environ de 1 mois à 12 ans).

### Posologie usuelle :

ISOMOL solution buvable se prend, à la dose de 20 à 30 mg / kg / 24 h correspondant approximativement à une posologie quotidienne moyenne de :

-Enfant en dessous de 1 an : 2,5 ml, 3 à 4 fois par jour.

-Enfant de 1 à 3 ans : 5 ml, 3 à 4 fois par jour.

-Enfant au dessus de 3 ans : 7,5 ml, 3 à 4 fois par jour.

Pour la mesure utiliser le gobelet doseur joint.

Les prises doivent être espacées d'au moins 4 heures.

En cas d'insuffisance rénale sévère (clairance de la créatinine inférieur à 10 ml / min) : l'intervalle entre deux prises sera au minimum de 8 heures.

## MODE D'ADMINISTRATION :

Absorber pur ou dilué dans une petite quantité de boisson (eau, lait, jus de fruit).

## CONSERVATION:

Entre 15 °c et 30 °c dans son emballage d'origine.

Date de révision : 01/2017

N° d'enregistrement : 03 / 03 B 006 / 073

Ne pas laisser les médicaments à la portée des enfants

## LABORATOIRES ISOPHARM-ALGÉRIE

U.P : Z.I TARF Ouled Rahmoun , B.P A75, EL Khroub 25100 Constantine. Tel: 031.95.44.04/05 Fax : 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail : isopharm@gmail.com



# إيزومول®

براسيتامول 100مغ/5مل - محلول للشرب 100مل

## الشكل والتقديم:

محلول للشرب  
قارورة ذات 100 مل  
وحدة قياس  
5 مل من المحلول للشرب = 100 مغ من العنصر الفعال

## التركيب:

براسيتامول ..... 2.00 غ  
-سواغ: براهيدروكسي بنزوات مثيل صودي، بروبييل صودي، سكروز، عطر  
كراميل فانيليا، ماء مصفى..... ك ك ل ..... 100 مل

## التصنيف الصيدلاني العلاجي:

مسكن للألم، مانع للحُمى [ الجهاز العصبي المركزي (N) ]

## الاستطباب:

علاج أعراض الإصابات المصحوبة بالألم (خفيف أو متوسط) أو الحمى.

## مضادات الاستطباب:

حساسية شديدة للبراسيتامول أو لإحدى المكونات خاصة براهيدروكسي  
بنزوات مثيل أو بروبييل.  
-قصور كبدي خلوي.

## تأثيرات غير مرغوب فيها:

-بعض حالات الحساسية النادرة: طفوح جلدي بسيط مع طفح وردي أو  
جلدي ذو بثور حكاكة مما يتطلب إيقاف العلاج.  
-حالات شاذة جدا يمكن حدوث نقصان في الصفائح الدموية.

## تفاعلات دوائية:

تناول البراسيتامول يؤثر سلبا على تقويم حامض اليوريك الدموي بطريقة  
حامض الفسفوفانستسيك وتقويم كمية السكر في الدم بطريقة الأوكسدة.

تنبيه: لتجنب الجرعة المفرطة يجب التأكد من عدم وجود البراسيتامول في  
تركيب الأدوية الأخرى المتناولة.

## إحتياطات الإستعمال:

عند الطفل المعالج بـ 60 مغ / كغ/ اليوم بالبراسيتامول، إستعمال دواء آخر  
مانع للحُمى غير مرغوب إلا في حالة ثبوت عدم فعالية البراسيتامول.

## المقادير وكيفية الاستعمال:

هذا التقديم مخصص للأطفال ( أي حوالي شهر إلى 12 سنة).

## المقادير المستعملة:

يستعمل "إيزومول" بمقدار 20 إلى 30مغ/ كغ / 2 4 ساعة أي تقريبا بما يلي:  
-أقل من سنة: 2.5 مل من وحدة القياس المرافقة، 3 إلى 4 مرات في اليوم.  
-من سنة إلى 3 سنوات: 5 مل من وحدة القياس المرافقة، 3 إلى 4 مرات  
في اليوم.

-فوق 3 سنوات: 7.5 مل من وحدة القياس المرافقة، 3 إلى 4 مرات  
في اليوم.

تقدر الفترة الزمنية بين جرعة وأخرى بـ 4 ساعات على الأقل.

في حالة قصور كلوي حاد (كرياتين أقل من 10 مل في الدقيقة) ترتفع الفترة  
الزمنية بين جرعة وأخرى إلى 8 ساعات على الأقل.

## كيفية الإستعمال:

يشرب صافٍ أو مخفف في كمية صغيرة من المشروبات التالية: ماء، حليب  
أو عصير الفواكه.

الحفظ: بين 15م° و 30م° في تعبئته الأصلية.

تاريخ المراجعة: 2017/01

رقم التسجيل: 073 / 006 B 03/03

هذا الدواء ، لا تتركه في متناول الأطفال

مخابر إيزوفارم - الجزائر

م.ص الطرف أولاد رحمون ص.ب 75 الخروب- قسنطينة 25100 الهاتف: 031.95.44.04/05 - الفاكس: 031.95.44.03/06/07

http://www.isopharm-algerie.com ~ E.mail: isopharm@gmail.com

